非コンパクト対称空間への群作用とその応用

田丸 博士 (広島大学大学院理学研究科)

第 59 回幾何学シンポジウム

九州大学

2012/08/27

1 イントロ

1.1 概要

本講演で話すこと:

- §2: 非コンパクト対称空間への群作用: 余等質性 1 作用
 - 具体例と性質,
 - “ラフな” 分類結果,
- §3: その応用: リー群上の左不変計量
 - モジュライ空間,
 - **Milnor frame** の高次元版,
 - 左不変計量に対応する部分多様体.

1.2 面白いと思われるところ

非コンパクト対称空間への群作用それ自身:

- 興味深い群作用や部分多様体の例を供給,
- コンパクト対称空間とは様相が全く異なる.

応用上:

- G : n 次元リー群 with リー代数 $\mathfrak{g}$
⇒ $\tilde{\mathfrak{M}} := \{G \text{ 上の左不変計量} \} \cong \{\mathfrak{g} \text{ 上の内積} \} \cong \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})/\mathrm{O}(n)$.
- $\tilde{\mathfrak{M}}$ は非コンパクト対称空間.
- $\tilde{\mathfrak{M}}$ への群作用の幾何と, G 上の左不変計量の幾何が, 密接に関連.

2 非コンパクト型対称空間への余等質性 1 作用

2.1 概要

定義:

- リーマン多様体への等長的作用が 余等質性 1 (cohomogeneity one)
:⇔ 最大次元の軌道 (= 非特異軌道) が余次元 1
⇔ 軌道空間が 1 次元.
- H, H' の作用が 軌道同値
:⇔ $\exists f \in \text{Isom}(M) : \forall p \in M, f(H.p) = H'.f(p).$

あらすじ: 非コンパクト型対称空間への余等質性 1 作用の

- 具体例と性質 (6pp.)
- ラフな分類 (6pp.)

2.2 参考: コンパクトな場合

例:

- $SO(2) \curvearrowright S^2$
 - ⇒ ◦ 余等質性 1,
 - 軌道空間 $\cong [0, 1]$,
 - 特異軌道は 2 つ.

事実:

- M : コンパクト既約単連結対称空間,
 $H \curvearrowright M$: 余等質性 1
 - ⇒ ◦ 軌道空間 $\cong [0, 1]$,
 - 特異軌道は常に 2 つ.
 - 各 M に対して余等質性 1 作用は有限個,
 - 分類済み (Hsiang-Lawson (1971), ... , Kollross (2002)),

2.3 余等質性 1 作用の例と性質 (1/6) - 上半平面

定理 ($\mathbb{R}H^2 = \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})/\mathrm{SO}(2)$):

- $\mathbb{R}H^2$ への余等質性 1 作用は, 次のいずれかと軌道同値:

$$\mathrm{SO}(2) \curvearrowright \mathbb{R}H^2$$

$$A \curvearrowright \mathbb{R}H^2$$

$$N \curvearrowright \mathbb{R}H^2$$

- ただしここで, $\mathfrak{a} = \left\{ \left[\begin{array}{c|c} a & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & -a \end{array} \right] \right\}$, $\mathfrak{n} = \left\{ \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{0} & * \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{array} \right] \right\}$

性質:

- $A.o$ は唯一の極小軌道 (測地線).
- N -軌道は全て合同 (ホ口円).

2.4 余等質性 1 作用の例と性質 (2/6) - 軌道空間

再掲:

$$SO(2) \curvearrowright \mathbb{R}H^2$$

$$A \curvearrowright \mathbb{R}H^2$$

$$N \curvearrowright \mathbb{R}H^2$$

定理 (Berndt-Brück, 2001):

- M : 非コンパクト型対称空間, $H \curvearrowright M$: 余等質性 1
 - $\Rightarrow$ ◦ 軌道空間 $\cong [0, +\infty)$ or $\mathbb{R}$.
 - 軌道空間 $\cong [0, +\infty)$ のとき $\exists 1$ 特異軌道 (0 のところ),
 - 軌道空間 $\cong \mathbb{R}$ のとき $\nexists$ 特異軌道.

2.5 余等質性 1 作用の例と性質 (3/6) - 例

やること:

- $N \simeq \mathbb{R}H^2$ の一般化.

記号:

- $M = G/K$: 非コンパクト型既約対称空間,
- $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{n}$: 岩澤分解.

命題 (Berndt-T., 2003):

- $\mathfrak{a} \supset \mathfrak{l}$: 1次元部分空間
 - $\Rightarrow$ ◦ $\mathfrak{s}_{\mathfrak{l}} := (\mathfrak{a} \ominus \mathfrak{l}) \oplus \mathfrak{n}$: 部分リー代数,
 - $S_{\mathfrak{l}} \simeq M$: 余等質性 1, 特異軌道なし, 全ての軌道が合同.

2.6 余等質性 1 作用の例と性質 (4/6) - 個数

再掲:

- M : コンパクト型単連結既約対称空間,
⇒ M への余等質性 1 作用は有限個 (up to 軌道同値).

再掲:

- $\mathfrak{a} \supset \mathfrak{l} : 1$ 次元部分空間
⇒ $S_{\mathfrak{l}} \simeq M$: 余等質性 1, 特異軌道なし, 全ての軌道が合同.

注意:

- $\text{rank}(M) = 1 \Rightarrow S_{\mathfrak{l}} = N$, 軌道はホウ球面.
- $\text{rank}(M) > 1 \Rightarrow S_{\mathfrak{l}}$ の取り方は連続的に存在.
(余等質性 1 作用も連続的に存在 (up to 軌道同値))

2.7 余等質性 1 作用の例と性質 (5/6) - 例

やること:

- $A \curvearrowright \mathbb{R}H^2$ の一般化.
- 復習: $A.o$ は唯一の極小軌道 (測地線).

記号:

- $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{n}$: 岩澤分解,
- $\Sigma = \Sigma(\mathfrak{g}, \mathfrak{a})$: 制限ルート系, $\mathfrak{n} = \bigoplus_{\alpha > 0} \mathfrak{g}_\alpha$.

命題 (Berndt-T., 2003):

- α_i : 単純ルート, $0 \neq X_i \in \mathfrak{g}_{\alpha_i}$
 - $\Rightarrow$ ◦ $\mathfrak{s}_i := \mathfrak{a} \oplus (\mathfrak{n} \ominus \mathbb{R}X_i)$: 部分リー代数,
 - $S_i \curvearrowright M$: 余等質性 1, 特異軌道なし,
 - 原点軌道 $(S_i).o$ が唯一の極小軌道.

2.8 余等質性 1 作用の例と性質 (6/6) - コメント

定理 (Berndt-T., 2003):

- $H \curvearrowright M$: 余等質性 1, 特異軌道なし
⇒ 先の S_ℓ or S_i のいずれかの作用に軌道同値.

次にやること:

- 特異軌道を持つ余等質性 1 作用
i.e., $\text{SO}(2) \curvearrowright \mathbb{R}H^2$ の一般化.

ここまでのまとめ:

- M : 非コンパクト型対称空間,
- $H \curvearrowright M$: 余等質性 1
⇒ “特別な軌道が一つだけ” という状況がしばしば起こる.
(特異軌道があればそれ, なくても唯一の極小軌道をもつ場合)

2.9 余等質性 1 作用のラフな分類 (1/6) - 前置き

概要:

- M : 非コンパクト型既約対称空間, $H \curvearrowright M$: 余等質性 1
 - ⇒ ◦ 特異軌道を持たない場合は分類できていた.
 - 特異軌道を持つものを分類したい.

定理 (Berndt-T., 2004):

- 余等質性 1 作用の特異軌道となる全測地的 $F \subset M$ の分類.

ということで:

- 全測地的でない特異軌道を持つ余等質性 1 作用を分類したい.

主結果 (Berndt-T., to appear):

- “canonical extension” or “nilpotent construction” により,
そのような作用は全て得られる.

2.10 余等質性 1 作用のラフな分類 (2/6) - 例

命題 (Berndt-T., to appear):

- $H \simeq SL_3(\mathbb{R})/SO(3)$: 余等質性 1, $\exists$ 非全測地的特異軌道

$\Rightarrow SO(2)S_{(2,1)}$ の作用と軌道同値,

$$\text{ここで } \mathfrak{s}_{(2,1)} := \left\{ \left[\begin{array}{cc|c} x & \mathbf{0} & * \\ \mathbf{0} & x & * \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} & y \end{array} \right] \mid \text{tr} = \mathbf{0} \right\}.$$

観察:

- $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{R}) \supset \mathfrak{q}_{(2,1)} := \left\{ \left[\begin{array}{cc|c} * & * & * \\ * & * & * \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} & * \end{array} \right] \mid \text{tr} = \mathbf{0} \right\}$: 放物型部分代数,
- $\mathfrak{q}_{(2,1)} = \mathfrak{sl}_2(\mathbb{R}) \oplus \mathfrak{s}_{(2,1)}$: Langlands 分解,
- $\mathfrak{s}_{(2,1)}$: その可解部分,
- $SO(2) \simeq (SL_2(\mathbb{R})).o = \mathbb{R}H^2$: 余等質性 1 作用, $\exists$ 特異軌道.

2.11 余等質性 1 作用のラフな分類 (3/6) - canonical extension

再掲:

$$\circ \mathfrak{sl}_3(\mathbb{R}) \supset \mathfrak{q}_{(2,1)} = \mathfrak{sl}_2(\mathbb{R}) \oplus \mathfrak{s}_{(2,1)} \supset \mathfrak{so}(2) \oplus \mathfrak{s}_{(2,1)}.$$

設定:

- $\mathfrak{g} \supset \mathfrak{q}_\Phi$: 放物型部分代数,
- $\mathfrak{q}_\Phi = \mathfrak{m}_\Phi \oplus \mathfrak{s}_\Phi$: Langlands 分解.

事実:

- $[\mathfrak{m}_\Phi, \mathfrak{s}_\Phi] \subset \mathfrak{s}_\Phi$,
- $M \supset (M_\Phi).o$: 全測地的.

命題 (Berndt-T., to appear)

- $H \curvearrowright (M_\Phi).o$: 余等質性 1 ($\exists$ 特異軌道)
 $\Rightarrow \tilde{H} := HS_\Phi \curvearrowright M$: 余等質性 1 ($\exists$ 特異軌道).

2.12 余等質性 1 作用のラフな分類 (4/6) - 例

例 (Berndt-T., to appear):

$$\circ \mathfrak{sl}_4(\mathbb{R}) \supset \mathfrak{h} := \left\{ \begin{bmatrix} * & * & * & * \\ \hline \mathbf{0} & * & * & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & * & * & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & * \end{bmatrix} \mid \text{tr} = \mathbf{0} \right\}.$$

$\Rightarrow H \curvearrowright SL_4(\mathbb{R})/SO(4)$: 余等質性 1, $\exists$ 非全測地的特異軌道.

観察:

$\circ \mathfrak{sl}_4(\mathbb{R}) \supset \mathfrak{q}_{(1,2,1)} = \mathfrak{l}_{(1,2,1)} \oplus \mathfrak{n}_{(1,2,1)}$: Chevalley 分解, ただし,

$$\mathfrak{l}_{(1,2,1)} = \begin{bmatrix} * & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & * & * & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & * & * & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & * \end{bmatrix}, \quad \mathfrak{n}_{(1,2,1)} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & * & * & * \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & * \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & * \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix}.$$

2.13 余等質性 1 作用のラフな分類 (5/6) - nilpotent construction

設定:

- $\mathfrak{g} \supset \mathfrak{q}_\Phi$: 放物型部分代数,
- $\mathfrak{q}_\Phi = \mathfrak{l}_\Phi \oplus \mathfrak{n}_\Phi$: Chevalley 分解.

事実:

- $\exists$ 自然な gradation : $\mathfrak{n}_\Phi = \mathfrak{n}_\Phi^1 \oplus \mathfrak{n}_\Phi^2 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{n}_\Phi^s$.

命題 (Berndt-T., to appear):

- $\mathfrak{n}_\Phi^1 \supset V$: “ある条件” を満たす線型部分空間
 - $\Rightarrow$ ◦ $N_{\mathfrak{l}_\Phi}(\mathfrak{n}_\Phi \ominus V) \oplus (\mathfrak{n}_\Phi \ominus V)$: 部分リー代数,
 - 対応する群の M への作用は余等質性 1, $\exists$ 特異軌道.

コメント:

- “ある条件” を満たす線型部分空間の分類は, 一般には難しい.

2.14 余等質性 1 作用のラフな分類 (6/6) - 主定理

定理 (Berndt-T., to appear):

◦ M への余等質性 1 作用は, 以下のいずれかと軌道同値:

(1) 特異軌道を持たない作用,

(2) 全測地的な特異軌道を持つ作用,

(3) “canonical extension” から得られる作用,

(4) “nilpotent construction” から得られる作用.

コメント:

◦ 上記の (1), (2) の作用は (既約なら) 分類済み.

◦ よって (3), (4) の作用を分類できれば嬉しい...

◦ 余等質性 1 作用が完全に分類出来てるもの:

$\mathbb{C}H^n$, $\mathbb{H}H^2$, $\mathbb{O}H^2$, $SL_3(\mathbb{R})/SO(3)$, $G_2^*(\mathbb{R}^5)$, $G_2^2/SO(4)$.

3 左不変計量の幾何への応用

3.1 概要

背景:

- リー群 G 上の左不変 Einstein 計量 / Ricci soliton 計量の研究,
- 特に, 構成, 存在・非存在の判定.

あらすじ:

- G 上の左不変計量の“モジュライ空間” (4pp.)
- Milnor frame の“高次元版” (3pp.)
- 左不変計量に“対応する部分多様体” (4pp.)

3.2 左不変計量のリモジュライ空間 (1/4) - 定義

事実:

- G : n 次元リー群 with リー代数 $\mathfrak{g}$
⇒ $\tilde{\mathfrak{M}} := \{G \text{ 上の左不変計量} \} \cong \{\mathfrak{g} \text{ 上の内積} \} \cong \text{GL}_n(\mathbb{R})/\text{O}(n)$.

定義:

- $\langle \cdot, \cdot \rangle_1, \langle \cdot, \cdot \rangle_2 \in \tilde{\mathfrak{M}}$ が スカラー倍を除いて等長的
:⇔ $\exists c > 0, \exists \varphi \in \text{Aut}(\mathfrak{g}) : \langle \cdot, \cdot \rangle_1 = c \langle \varphi^{-1}(\cdot), \varphi^{-1}(\cdot) \rangle_2$.
- 次を リモジュライ空間 と呼ぶ:
 $\mathfrak{M} := \tilde{\mathfrak{M}} / (\text{スカラー倍を除いて等長的})$.

注意:

- $(\mathfrak{g}, \langle \cdot, \cdot \rangle_1)$ と $(\mathfrak{g}, \langle \cdot, \cdot \rangle_2)$ がスカラー倍を除いて等長的
⇒ 対応する単連結な $(G, \langle \cdot, \cdot \rangle_1)$ と $(G, \langle \cdot, \cdot \rangle_2)$ も,
(リーマン多様体として) スカラー倍を除いて等長的.

3.3 左不変計量のもジュライ空間 (2/4) - 性質

定義:

- $\mathbb{R}^\times \text{Aut}(\mathfrak{g}) := \{c\varphi \in \text{GL}(\mathfrak{g}) \mid c \in \mathbb{R}^\times, \varphi \in \text{Aut}(\mathfrak{g})\}.$

命題 (児玉-高原-T., 2011):

- 同値類は次を満たす: $[\langle, \rangle] = \mathbb{R}^\times \text{Aut}(\mathfrak{g}).\langle, \rangle \subset \tilde{\mathfrak{M}}.$
- $\mathfrak{B}\mathfrak{M} = \mathbb{R}^\times \text{Aut}(\mathfrak{g}) \backslash \tilde{\mathfrak{M}} \cong \mathbb{R}^\times \text{Aut}(\mathfrak{g}) \backslash \text{GL}_n(\mathbb{R}) / \text{O}(n).$

3.4 左不変計量のもジュライ空間 (3/4) - 例

定理 (Lauret, 2003):

- $\mathfrak{g}$ に対して, G 上の左不変計量がスカラー倍と等長的を除いて一意
⇔ (1) $\mathbb{R}^n$: 可換リー代数,
(2) $\mathfrak{g}_{\mathbb{R}H^n} := \text{span}\{e_1, \dots, e_n\}$ with $[e_1, e_j] = e_j$ ($j \geq 2$),
(3) $\mathfrak{h}_3 \oplus \mathbb{R}^{n-3} := \text{span}\{e_1, \dots, e_n\}$ with $[e_1, e_2] = e_3$.

命題 (児玉-高原-T., 2011):

- 上記の (1), (2), (3) のリー代数
⇒ $\mathbb{R}^\times \text{Aut}(\mathfrak{g}) \curvearrowright \tilde{\mathfrak{m}}$: 推移的
⇒ $\mathfrak{B}\mathfrak{m} = \{\text{pt}\}$.

(これは Lauret の定理の (⇔) の簡単な別証明を与えている)

3.5 左不変計量のもジュライ空間 (4/4) - 例

例 (児玉-高原-T., 2011):

- $\mathfrak{g} = \text{span}\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ with $[e_1, e_2] = e_2$

$$\Rightarrow \circ \mathbb{R} \oplus \text{Der}(\mathfrak{g}) = \left\{ \begin{bmatrix} * & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ * & * & * & \mathbf{0} \\ * & * & * & \mathbf{0} \\ * & \mathbf{0} & \mathbf{0} & * \end{bmatrix} \right\},$$

- $\mathbb{R}^\times \text{Aut}(\mathfrak{g}) \simeq \tilde{\mathfrak{M}}$: 余等質性 1 (前述). (よって $\dim \mathfrak{PM} = 1$.)

$$\circ \mathfrak{PM} = \{[g_\lambda \cdot \langle, \rangle_0] \mid g_\lambda = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \lambda & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix}, \lambda \geq 0\} \cong [0, +\infty).$$

- 他にも $\forall n \geq 3, \exists \mathfrak{g} : \dim \mathfrak{g} = n, \dim \mathfrak{PM} = 1$.

3.6 Milnor 型定理 (1/3) - 3 次元の復習

定理 (Milnor, 1976):

- $\mathfrak{g}$: 3 次元 unimodular リー代数, $\langle, \rangle$: 任意の内積
⇒ $\exists \{x_1, x_2, x_3\}$: 正規直交基底, $\exists \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$:
 $[x_1, x_2] = \lambda_3 x_3, [x_2, x_3] = \lambda_1 x_1, [x_3, x_1] = \lambda_2 x_2.$

コメント:

- 各 $\mathfrak{g}$ ごとに $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ の取り得る値は確定している。
(これを使って左不変 Einstein 計量の存在・非存在などが分かる)
- 証明は $\dim = 3$ に強く依存している。

観察:

- $\dim \mathfrak{g} = 3$ なので $\dim \tilde{\mathfrak{m}} = 6$. なのにパラメータは 3 つ。
→ これは $\text{Aut}(\mathfrak{g}) \backslash \tilde{\mathfrak{m}}$ を表示している。

3.7 Milnor 型定理 (2/3) - 主定理

定理 (橋永-T.-寺田, preprint):

- $\mathfrak{so}(4)$ の具体的な表示 $\rightarrow$ Milnor 型定理が得られる.

例 (Milnor 型定理):

- $\mathfrak{g} = \text{span}\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ with $[e_1, e_2] = e_2$
- $\langle, \rangle$: 任意の内積
 $\Rightarrow \exists k > 0, \exists \lambda \geq 0, \exists \{x_1, \dots, x_4\}$: 正規直交基底 wrt $k\langle, \rangle$
s.t. $[x_1, x_2] = x_2 + \lambda x_4$.

系:

- $\mathfrak{g} = \text{span}\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ with $[e_1, e_2] = e_2$
 $\Rightarrow$
 - Ricci 曲率の符号は $(+, 0, -, -)$ or $(0, 0, -, -)$.
 - ∇ 左不変 Einstein 計量.

3.8 Milnor 型定理 (3/3) - コメント

再掲 (橋永-T.-寺田, preprint):

- $\mathfrak{B}\mathfrak{M}$ の具体的な表示 $\rightarrow$ Milnor 型定理が得られる.

コメント:

- $\mathfrak{B}\mathfrak{M}$ の表示がきれい (e.g. $\mathbb{R}^\times \text{Aut}(\mathfrak{g}) \curvearrowright \tilde{\mathfrak{M}}$ が余等質性 1)
 $\Rightarrow$ 有効な Milnor 型定理.
- $\mathfrak{B}\mathfrak{M}$ の表示がきれいでない (e.g. $\mathbb{R}^\times \text{Aut}(\mathfrak{g})$ が小さい)
 $\Rightarrow$ Milnor 型定理は得られるが有効でない.

3.9 対応する部分多様体 (1/4) - 定義

定義:

- 同値類 $[\langle, \rangle]$ を $\langle, \rangle$ に対応する部分多様体.

$$(\text{復習: } [\langle, \rangle] = \mathbb{R}^{\times} \text{Aut}(\mathfrak{g}).\langle, \rangle \subset \tilde{\mathfrak{m}})$$

問題:

- $\langle, \rangle$: 特別な計量 $\Leftrightarrow [\langle, \rangle]$: 特別な部分多様体?

復習:

- 非コンパクト型対称空間への余等質性 1 作用
⇒ “特別な軌道” が唯一つ存在することがしばしば起こる.

3.10 対応する部分多様体 (2/4) - 代数的 Ricci soliton

定義:

- リーマン多様体 (M, g) が Ricci soliton
: $\Leftrightarrow \exists c \in \mathbb{R}, \exists X \in \mathfrak{X}(M) : \text{ric}_g = cg + \mathcal{L}_X g.$
- $(G, \langle, \rangle)$ (リー群 + 左不変計量) が 代数的 Ricci soliton
: $\Leftrightarrow \exists c \in \mathbb{R}, \exists D \in \text{Der}(\mathfrak{g}) : \text{Ric}_{\langle, \rangle} = c \cdot \text{id} + D.$

定理 (Lauret, 2011; Jablonski, preprint):

- 左不変 Einstein
⇒ 代数的 Ricci soliton
⇒ Ricci soliton.
- 可解リー群上の左不変 Ricci soliton
⇒ 代数的 Ricci soliton と等長的.

3.11 対応する部分多様体 (3/4) - 例

復習:

- $\mathfrak{g} = \text{span}\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ with $[e_1, e_2] = e_2$

$$\Rightarrow \circ \mathfrak{PM} = \{[g_\lambda \cdot \langle, \rangle_0] \mid g_\lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 1 \end{bmatrix}, \lambda \geq 0\} \cong [0, +\infty).$$

- $\langle, \rangle_0$: 代数的 Ricci soliton.

- $\mathbb{R}^\times \text{Aut}(\mathfrak{g}) \curvearrowright \tilde{\mathfrak{M}}$: 余等質性 1, $\exists 1$ 特異軌道.

観察:

- $g_\lambda \cdot \langle, \rangle_0$: 代数的 Ricci soliton

$$\Leftrightarrow \lambda = 0$$

$$\Leftrightarrow [g_\lambda \cdot \langle, \rangle_0] \text{ が (唯一の) 特異軌道.}$$

3.12 対応する部分多様体 (4/4) - 3次元の場合の結果

定理 (橋永-T., in preparation):

◦ $\mathfrak{g}$: 3次元可解リー代数のとき,

$\langle, \rangle$: 代数的 Ricci soliton $\Leftrightarrow \tilde{\mathfrak{M}} \supset [\langle, \rangle]$: 極小.

(注: $\tilde{\mathfrak{M}} = GL_3(\mathbb{R})/O(3)$ には自然な $GL_3(\mathbb{R})$ -不変計量を入れる)

もう少し詳しく言うと:

リー代数	説明	作用	計量
$\mathfrak{h}^3$	Heisenberg	推移的	$\exists$ Ricci soliton
$\mathfrak{r}_{3,1}$	$\mathfrak{g}_{\mathbb{R}H^3}$	推移的	$\exists$ 負定曲率
$\mathfrak{r}_3$	可解	$\nexists$ 極小軌道, 合同性	$\nexists$ Ricci soliton
$\mathfrak{r}_{3,a}$	可解	$\exists$ 極小軌道 (非特異)	$\exists$ Ricci soliton
$\mathfrak{r}'_{3,a}$	可解	$\exists$ 極小軌道 (特異)	$\exists$ Einstein

4 まとめ

4.1 まとめ

大枠:

- 非コンパクト対称空間への群作用

U

- $GL_n(\mathbb{R})/O(n)$ への群作用 $\leftrightarrow$ リー群上の左不変計量
(軌道空間 $\leftrightarrow$ モジュライ空間, Milnor 型定理)
(軌道 $\leftrightarrow$ 対応する部分多様体)

今回紹介したこと:

- 非コンパクト対称空間への余等質性 1 作用,
- $\mathbb{R}^\times \text{Aut}(\mathfrak{g})$ -作用が余等質性 1 の場合の左不変計量の幾何.

4.2 さらなる課題

今後の課題 1:

- この研究を進める, i.e.,
 - 非コンパクト対称空間への余等質性 1 でない群作用の研究,
 - もっと一般のリー群における左不変計量の研究.

今後の課題 2:

- 同様の枠組みによる他の幾何構造の研究, e.g.,
 - 左不変エルミート計量 $\leftrightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})/\mathrm{U}(n)$ への群作用,
 - 左不変擬リーマン計量 $\leftrightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})/\mathrm{O}(p, q)$ への群作用,
 - 左不変複素構造, 左不変シンプレクティック構造, ...
- すなわち,
 - 様々な (擬リーマンを含む) 対称空間への群作用の研究,
 - 様々な左不変幾何構造の研究.